



Retningslinier vedr. sygdom

Disse retningslinier arbejder vi efter i vuggestuen og er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Vi retter os efter Sundhedsstyrelsens vejledning for smitsomme sygdomme.

Feber

Et barn må ikke være i vuggestuen med feber. Hvis barnet har 38 eller over, ringer vi det hjem. Et barn kan godt være sygt uden at have feber, så du kan muligvis opleve, at vi sender dit barn hjem uden feber.

Øjenbetændelse

Et barn med øjenbetændelse bør tilses af lægen. Når barnet har været i behandling mindst 2 døgn, og symptomerne er forsvundet, må det komme i institution, selv om behandlingen skal fortsætte i længere tid.

Børnesår

Børnesår er en meget smitsom sygdom, som kan optræde overalt på kroppen. Børnene må ikke komme i institution, før sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af. Selv om der er iværksat behandling, kan sårene godt smitte.

Hånd-, fod- og mundsyge

Minder i udseende om skoldkopper og optræder primært i hænder, fødder og munden. Barnet må komme i vuggestue, når de ikke er medtaget af sygdommen og har feber længere.

Opkast og diaré

Når barnet er rask og afføringen er normal må barnet komme i institution igen. I tilfælde af Roskildesyge (norovirus) anbefales dog 2 dage hjemme, efter at diaré og opkast er ophørt.

Mellemørebetændelse med øreflåd

Et barn med mellemørebetændelse må kun være i vuggestue, hvis lægen konstaterer, at evt. øreflåd ikke er smitsomt.

Skarlagensfeber

Barnet kan komme i institution 2 dage efter opstartet behandling med penicillin, såfremt barnet er symptomfri.

Skoldkopper

Skoldkopper smitter meget og hurtigt, og barnet må først komme i vuggestue, når skorperne er tørret ind og smittefaren er overstået.

Børneorm

Børneorm viser sig, som små sytrådslignende orme ved endetarmsåbningen, og det klør meget. Smitten spredes via æg på fingrene og under neglene, som kommer i munden. Hele familien skal behandles, og barnet må komme i vuggestue, når behandlingen er iværksat.